

# Mesurol Snigelgift

## Användningsområde

Får endast användas i yrkesmässig odling. Mot sniglar i odlingar av köksväxter före plantering eller uppkomst samt i stråsäd och oljeväxter senast vid 4–5 bladstadiet. Mot sniglar och öronvivlar i odlingar av jordgubbar före blomning eller efter skörd. Mot gråsuggor i odlingar av rosor. Mot sniglar i odlingar av icke ätliga plantskoleväxter. Medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det.

## Verkningsätt

Verksam beståndsdel Merkaptodimetur 4 vikt-%. Mesurol snigelgift är en pelletsformulering med mycket god lockverkan och förtärs begärligt av sniglar. Mesurol snigelgift används där man har problem med sniglar, snäckor etc i växthus, grönsaksodlingar samt i lantbruksgrödor som oljeväxter och stråsäd. Bekämpningsbehovet är särskilt stort i direktsådda höstoljeväxter och höstsäd. I raps är angreppen speciellt allvarliga under uppkomsten och första tiden därefter.

Väderleksförhållanden med hög fuktighet och hög temperatur, dålig myllning av utsädet, platser med grov struktur och riklig mängd växtrester ger gynnsamma betingelser för sniglar och ökar skaderisken. Mesurol snigelgift bör helst strös ut på eftermiddagen eller kvällen. En jämn spridning ger bäst resultat. Vid riklig förekomst av skadedjur kan preparatet vara uppätet redan morgonen efter behandlingen. För skydd mot ytterligare eller långvariga angrepp måste behandlingen i sådana fall upprepas.

## Rekommendationer

### **Lantbruk och köksväxter**

Mesurol sprids jämnt över fältet med t ex speciell granulatspridare, handelsgödselspridare eller såmaskin (med billarna uppfällda). Mesurol kan även blandas med kornade handelsgödselmedel och spridas med gödselspridare. I köksväxter endast före plantering eller uppkomst. Dosering 3–5 kg/ha.

### **Jordgubbar**

Strö ut Mesurol på alla ställen där skadedjuren håller till. Sprid gärna även runt växthus och drivbänkar. Dosering 3–5 kg/ha eller 3–5 g/10 m<sup>2</sup>, dvs 20–30 korn/m<sup>2</sup>.

## Att tänka på

### **Direktsådd**

Vid direktsådd av höstgrödor kan en förebyggande Mesurolspridning vid sådden vara motiverad. Antingen som spridning över hela fältet eller som en kantbehandling med en eventuellt uppföljande spridning senare.

### **Appliceringsteknik**

Vid användning på små ytor sprids preparatet ut på jorden omkring plantorna och ej på växten. I växthus kan under varma och fuktiga förhållanden mögel bildas på preparatet. Använd i sådana fall låg dosering och upprepa behandling.

OBS! Se till att hundar och andra husdjur ej kommer åt preparatet.