



Mesurool Snigelgift

Molluskicid – Bekämpningsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 2412

MESUROL®

Registreringen har upphört, får användas fram till och med 2013-03-29.

Användningsområde

Mot sniglar i odlingar av köksväxter före plantering eller uppkomst samt stråsäd och oljeväxter senast vid 4–5 bladstadiet.

Mot sniglar och örönvivar i odlingar av jordgubbar före blomning eller efter skörd.

Mot gråsuggor i odlingar av rosor.

Mot sniglar i odlingar av icke ätliga plantskoleväxter.

Medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda	Skadegörare	Tillåten behandling					Maxdos, totalt/ha	Karens-tid, antal dagar
		Tidpunkt utvecklingsstadium	Maxdos /behandl.	Max antal behandl.	Intervall behandl.	Vätskemängd l/ha		
Stråsäd	Sniglar	DC 00-15	5 kg/ha	2	7	-	10 kg	-
Oljeväxter	Sniglar	DC 00-15	5 kg/ha	2	7	-	10 kg	-
Köksväxter	Sniglar	upp till 4–5 bladsstadiet	5 kg/ha	2	7	-	10 kg	-
Jordgubbar	Sniglar	före blomning och efter skörd	5 kg/ha	2	7	-	10 kg	-
Inte ätliga plantskoleväxter	Sniglar	upp till 4–5 bladsstadiet	5 kg/ha	2	7	-	10 kg	-

Verksam beståndsdel

Metiokarb 4 vikt-%.

Användning

Mesurool snigelgift är en pelletsformulering med mycket god lockverkan och förtärs begärligt av sniglar.

Mesurool används där man har problem med sniglar, snäckor etc. i växthus, grönsaksodlingar samt i lantbruksgrödor som oljeväxter och stråsäd.

Bekämpningsbehovet är särskilt stort i direktsådda höstoljeväxter och höstsäd. I raps är angreppen speciellt allvarliga under uppkomsten och första tiden därefter.

Väderleksförhållanden med hög fuktighet och hög temperatur, dålig myllning av utsädet, platser med grov struktur och riklig mängd växtrester ger gynnsamma betingelser för sniglar och ökar skaderisken. Mesurool bör helst strös ut på eftermiddagen eller kvällen. En jämn spridning ger bäst resultat. Nederbörd påverkar inte nedbrytningen av produkten, man kan påräkna effekt cirka tre veckor, även efter kraftigt regn. Vid riklig förekomst av skadedjur kan preparatet vara uppätet redan morgonen efter behandlingen. För skydd mot ytterligare eller långvariga angrepp bör behandlingen upprepas. Högst 2 behandlingar per år, med minst 7 dagars intervall.

Rekommendation

Stråsäd, oljeväxter och köksväxter

Mesurool sprids jämnt över fältet med t.ex. speciell granulatspridare, handelsgödselspridare eller såmaskin (med uppfällda billar). Mesurool kan även blandas med kornade handelsgödselmedel och spridas med gödselspridare.

I stråsäd och oljeväxter senast vid 4–5 bladsstadiet.

I köksväxter endast före plantering eller uppkomst.

Dosering 3–5 kg/ha.

Direktsådd

Vid direktsådd av höstgrödor kan det vara motiverat med en förebyggande mesuroolbehandling vid sådd. Antingen som spridning över hela fältet eller som en kantbehandling, upprepa vid behov.



Jordgubbar, rosodling och icke ätliga plantskoleväxter

Strö ut Mesurol på alla ställen där skadedjuret håller till. Sprid gärna även runt växthus och drivbänkar.

Dosering 3–5 kg/ha eller 3–5 g/10 m², dvs 20–30 korn/m².

Appliceringsteknik

Vid användning på små ytor sprids preparatet ut på jorden omkring plantorna och ej på växten. I växthus kan under varma och fuktiga förhållanden mögel bildas på preparatet. Använd i sådana fall låg dosering och upprepa behandling.

OBS! Se till att hundar och andra husdjur ej kommer åt preparatet.

Rengöring av spridare

Fyll inte mer i spridaren än vad som åtgår vid behandlingen. Efter utförd behandling rengörs spridaren och eventuella preparatresterna sprids ut på behandlat fält.

Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spridare.

Övrigt

Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen.

Transportförpackning 1 á 20 kg.