

Previcur N

Fungicid – Bekämpningsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 3471



PREVICUR^N

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat, sallat och prydnadsväxter. Behandling av ätliga växter får ej ske senare än 21 dagar före skörd.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda	Tillåten behandling					
	Skadegörare	Tidpunkt, utvecklingsstadium	Maxdos	Max antal behandl.	Vätskemängd	Karenstid, antal dagar
Sållådor	Svampsjukdomar	Före sådd	10 ml/m ²	Gurka, tomat och prydnadsväxter: 4	2–4 l/m ²	-
Sticklingar		Före stickning	15,0 ml/m ²		5–10 liter	-
Blomsterlök och knölar		Doppning före plantering	0,30 %		-	-
Jordbehandling		Före etablering	15,0 ml/m ²		3 l/m ²	-
Gurka och tomat	Svampsjukdomar	Efter utplantering Vattning	375 ml/1 000 plantor	Sallat: 2	200–250 l/1 000 plantor	21
		Efter utplantering Droppbevattning	62,5 ml/1 000 plantor		500 l/1 000 plantor	
Sallat	Svampsjukdomar	Efter utplantering	2 l/ha		800–1 200 l/ha	21
Prydnadsväxter	Svampsjukdomar	Före plantering	15,0 ml/m ²		3 l/m ²	-
		Efter inkrukning	150 ml/1 000 11 cm kruka		100 l/1 000 11 cm kruka	-

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 722g/l.

Verkningsätt

Pervicur N är ett systemiskt medel som upptas huvudsakligen genom plantornas rötter. Pervicur N är skonamt för växande plantor och kan användas och ge skydd under hela kulturtiden från groende frön till rotade sticklingar och krukade växter.

Pervicur N är fullständigt vattenlösligt, men fastläggs till behandlat djup. Nedbrytningen sker huvudsakligen av markens mikroorganismer. Beroende på lokala förhållanden sträcker sig verknings tiden över 4–5 veckor.

Användning

Pervicur N har god verkan mot skadesvampar i gruppen Phycomycetes, bl.a. Pythium och Phytophthoraarter, som tidigare varit svåra att kontrollera.

Rekommendation

Se sida 97 för koncentrationstabell.	
Sållådor	Före sådden vattnas lådorna med 5–10 ml Pervicur i 2–4 l vatten per m ² .
Sticklingar	Omedelbart före stickningen vattnas med 7,5–15,0 ml Pervicur i 5–10 l vatten per m ² .
Blomsterlök och knölar	Mot mjukröta och bruna rötter: Lökarna skalas och doppas 20 minuter i en lösning 0,3 % Pervicur (3 ml i 1 l vatten). Vattentemperatur 10–13 °C.
Jordbehandling	Bädden behandlas med 15 ml Pervicur i 3 l vatten/m ² . Vattnas ut med stril och inarbetas i jorden till 10–12 cm djup.
Köksväxter	Gurka och tomat i växthus mot Pythium och Phytophthora spp: Vattna med 0,15 % lösning (150 ml Pervicur i 100 l vatten) 200–250 ml per planta omedelbart efter utplanteringen. Se till att stambasen blir ordentligt indränkt. Om nödvändigt upprepas behandlingen efter 3–4 veckor. Pervicur kan även appliceras genom droppbevattning. Koncentration 0,0125 % lösning (12,5 ml Pervicur i 100 l vatten) och 0,5 l vätska per planta.
Krukväxter	Efter inkrukningen vattnas med Pervicurlösning 150 ml per 100 l vatten. Cirka 100 ml till varje 11 cm kruka. Vid behov upprepas behandlingen med 4–5 veckors mellanrum. Undvik spill på växternas bladverk. Om detta inte kan undvikas skölj efter med rent vatten.
Utplanterade prydnadsväxter i växthus och på friland	Före plantering vattnas med stril 15 ml Pervicur i 3 l vatten per m ² , varefter jorden omblandas. Plantorna bör också behandlas med Pervicur.
Sallat	Mot sallatsbladmögel (Bremia lactucae). Spruta 1,5–2,0 l Pervicur i 800–1 200 l vatten per ha. Om nödvändigt upprepa behandlingen efter 14 dagar.



Bayer CropScience

Blandbarhet

Kan blandas med andra svampmedel, men gör alltid en provblandning i hink vid osäkerhet.

Tillredning av sprutvätskan

Normalt används 0.15 % lösning = 150 ml Previcur N i 100 liter vatten.

Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Rengöring av sprututrustning se sida 101**Resistens**

Återkommande användning av samma medel eller av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan verkningsmekanism. Följs nämnda förhållningsregler anses resistensrisken vara låg.

För risk- och skyddsfraser, se sida 94**Övrigt**

Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. Tål lagring ner till -5 °C.

Transportförpackning 10 förpackningar á 1 liter.