



Sibutol FS 199

Betningsmedel – Bekämpningsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4566

Sibutol
FS 199

Användningsområde

Mot svampsjukdomar i stråsåd genom betning av utsäde.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.
Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda	Skadegörare	Tillåten behandling					Maxdos, totalt/ha	Karenstid, antal dagar
		Tidpunkt utvecklingsstadium	Maxdos /behandl.	Max antal behandl.	Intervall behandl.	Vätskemängd l/ha		
Stråsåd	Mark- och utsädesburen av smitta stinksot, samt mot Fusarium och Septoria	DC 00	375 ml/kg	1	-	-	750 ml/ha	-

Verksamma beståndsdelar

Bitertanol 17,4 vikt-%, Fuberidazol 1,1 vikt-%.

Verkningsätt

Sibutol är kontaktverkande men har även en viss systemisk effekt. Produkten ger genom sin verkan ett skydd under uppkomstfasen medan effekten avtar efter plantans uppkomst.

Rekommendation

Sibutol FS 199 är ett flytande betningsmedel som används för betning av främst vete (höst och vår), råg och rågvete. Preparatet är en färdig lösning som normalt inte skall blandas med vatten. Före betning med Sibutol skall doseringssystem, slangar etc, rengöras med T-sprit och vatten.

Eftersträva jämn fördelning av betningsmedlet på kärnorna och kontrollera att rätt dos erhålles. Behandla ej svaga utsädespartier med dålig grobarhet eller utsädespartier med en vattenhalt över 16 %. Undvik överlagring av betat utsäde. Betning av utsäde kan ske ned till -5 °C under förutsättning att preparatet förvaras i frostfritt utrymme.

Dosering	Dosering	Skadegörare
150 ml/dt		Fusarium, Septoria, stinksot (både utsädes- och markbunden)
225 ml/dt		Fusarium, Septoria, stinksot (både utsädes- och markbunden) och dvärgstinksot i vetesorterna Stava och Magnifik
375 ml/dt		Fusarium, Septoria, stinksot (både utsädes- och markbunden) och dvärgstinksot i vete i övriga sorter
150 ml/dt Sibutol FS 199 100 ml/dt Dividend Formula M		Fusarium, Septoria, stinksot (både utsädes- och markbunden) och dvärgstinksot i vete i övriga sorter

Sibutol FS 199 har även god effekt mot stråsåt på råg m.fl. utsädesburna sjukdomar. De lägre doserna fodrar god appliceringsteknik och hög kvalitet på betningen. Vid sådd under ogynnsamma förhållanden bör såddjupet vara högst 4 cm.

Blandbarhet

Sibutol FS 199 är blandbart med andra vattenbaserade betningsmedel. Sibutol FS 199 kan blandas med t.ex. Dividend Formula M. Kontakta Bayer CropScience för ytterligare information.

Rengöring av betningsutrustning

Efter utförd behandling sköljs betningsutrustningen med vatten. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel. Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och utrustning.

Resistens

Upprepad användning av samma medel eller medel med samma verkningsmekanism kan resultera i uppkomst av resistens. För att undgå detta, rekommenderas det att med jämna mellanrum använda medel med annan verkningsmekanism. Följs nämnda förhållningsregler anses resistensrisken vara låg.

För risk- och skyddsfraser, se sida 95

Övrigt

Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. **Transportförpackning** 1 000 liter container.

